

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

- **Personalia**
- **Avuloxil tijdelijk niet leverbaar**
- **Gebruik van Novem20 bij kalveren onthoornen**
- **Evaluatie BBP/BGP vóór 1 april**
- **Brief Medirund over hoge dierdagdosering**
- **Longworm vaccinatie**

Geachte Melkveehouder,

## **Personalia**

Peter Stoop is gelukkig restloos hersteld van een hernia die hem enkele maanden aan de kant heeft gehouden. Hij heeft zijn werkzaamheden weer voor 100% opgepakt.

## **Avuloxil tijdelijk niet leverbaar**

Avuloxil is tot eind juni niet leverbaar wegens een storing in het productieproces bij de farmaceut. Het alternatief voor Avuloxil is Albiotic Formula. Dit is een preparaat dat net als Avuloxil geregistreerd is voor de behandeling van klinische mastitis tijdens de lactatie veroorzaakt door stafylococcen, streptococcen en E. coli.

Bij elke verpakking Albiotic Formula wordt een schriftelijke verklaring gevoegd dat u als veehouder mag afwijken van het reeds eerder opgestelde bedrijfsbehandelplan gedurende de periode dat Avuloxil niet leverbaar is.

## **Gebruik Novem20 bij kalveren onthoornen**

Op veel bedrijven worden de kalveren periodiek onthoorned. Omdat dit een pijnlijke ingreep is voor de kalveren worden ze door de dierenarts verdoofd (wettelijk verplicht). Deze lokale verdoving werkt ongeveer 3-4 uur.

...beter voor  
het welzijn van  
boer en kalf!

Uit Canadees onderzoek is gebleken dat kalveren tot 2 dagen na onthoornen meer liggen, veel met de kop en de oren schudden, niet of minder met de kop door het voerhek willen en minder voer opnemen.

Om de pijn te verlichten kunt u de kalveren een lang werkende pijnstiller geven, wat neerkomt op 1 ml Novem20 per 40 kg. Uit het Canadese onderzoek, maar ook uit ervaring binnen de praktijk blijkt dat de kalveren actiever zijn, beter door het voerhek willen en daardoor meer voer opnemen. Dit voorkomt een dip in de weerstand waardoor ziekten zoals diarree en longontsteking aan kunnen slaan. Kortom: beter voor het welzijn van boer en kalf!

## Evaluatie BBP/BGP vóór 1 april

- Vóór 1 april dient uw BBP en BGP geëvalueerd en opnieuw opgesteld te worden. U bent zelf verantwoordelijk om hiervoor een afspraak te maken met uw dierenarts.
- Veehouders die reeds samen met hun dierenarts het bedrijfspecifieke behandel plan en het gezondheidsplan hebben geëvalueerd, moeten niet vergeten deze digitaal te ondertekenen in Veeonline.

## Brief Medirund over hoge dierdagdosering

Een aantal veehouders heeft vorige maand een brief van Medirund ontvangen waarin een aanzienlijk hogere dierdagdosering (DDD) stond vermeld dan verwacht mocht worden op basis van de getallen die wij doorgegeven hadden bij de tussentijdse bespreking van de DDD. Dit bleek in alle gevallen te komen door een fout in de koppeling van de zogenaamde EAN-code waardoor 1 **ml** Colisol (gebruikt bij een uierinfuus) uit ons systeem in het systeem van Medirund terecht kwam als 1 **liter** Colisol. In Medirund is dit inmiddels aangepast. De berekening wordt in Medirund echter maar een keer per kwartaal gedaan dus in het systeem staat nog steeds het oude getal.

Veehouders die boven de actiewaarde van 11.5 zaten door deze fout hebben een brief moeten insturen naar hun zuivelaar met een verklaring en een handtekening van de dierenarts. Veehouders die onder deze actiewaarde zaten hebben een (onterechte) waarschuwing gekregen over de hoogte van hun DDD maar hoeven hier geen verdere actie op te ondernemen.

## Longworm vaccinatie

De mest wordt weer uitgereden en het voorjaar staat weer voor de deur. Hét moment om na te denken over longworm vaccinatie van uw (oudere) jongvee. Dieren die voor de eerste maal naar buiten gaan en op besmette weide komen lopen groot risico tegen een longworm infectie aan te lopen.

... een trektocht maken van de darm naar de long.

Koeien en pinken die longwormlarven uitscheiden besmetten de weide. De larven worden via het gras opgenomen in het lichaam waar ze een trektocht maken van de darm naar de long. Daar vermenigvuldigt de longworm zich, waarna nieuwe larven opgehoest en doorgeslikt worden om zo de weide opnieuw te besmetten.

Jongvee dat gevaccineerd wordt, krijgt via een drankje verzwakte larven toegediend die wel naar de longen trekken maar niet volwassen worden. Gevaccineerde kalveren kunnen dus geen andere runderen besmetten. Op deze manier komt het lichaam in aanraking met de longworm en bouwt het weerstand op. De longworm entstof moet tijdig worden toegediend, de eerste vaccinatie 6 weken voor de weidegang, de tweede vaccinatie 4 weken later (2 weken voor weidegang).

Laat het ons tijdig weten als u wilt gaan vaccineren, de entstof wordt namelijk op naam besteld en er gaan een aantal werkdagen overheen voordat het binnen is.

**Diergeneeskundig centrum Zuid-Oost Drenthe**  
**24 uur per dag, 7 dagen in de week**  
**Coevorden: 0524-513 694**  
**Sleen: 0591-361 368**