

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

- **(Ont)Wormen van schapen en geiten.**
- **Wolschurft**
- **Bescherming tegen 'Het Bloed' en Zomerlongontsteking.**
- **Brucella-monitoring**

Geachte Schapenhouder,

Het lammerseizoen is in volle gang en het voorjaar komt dichterbij. Tijd om alvast na te denken over risico's tijdens het weideseizoen. In deze nieuwsbrief leest u dan ook meer over ontwormen en vaccinaties.

(Ont)Wormen van schapen en geiten

Volwassen schapen en geiten hoeven in de regel maar eenmaal per jaar ontwormd te worden, indien ze regelmatig worden omgeweid. Wanneer u twijfelt, kunt u in de zomermaanden mestonderzoek laten doen. Het beste moment om de volwassen schapen te behandelen is in het voorjaar, vóórdat de ooien met de lammeren naar buiten gaan.

Voor het ontwormen van volwassen schapen en geiten zijn ontwormingspillen (Panacur) ongeschikt, omdat de meest voorkomende wormen hier ongevoelig voor zijn. Een wormmiddel met daarin doramectine (Dectomax) een of moxidectine (Cydectin) heeft de voorkeur. Tegen deze middelen is in ons praktijkgebied nog geen resistentie aangetoond.

Het ontwormen van lammeren vraagt een andere aanpak. Om de infectiekans te verminderen is het verstandig om lammeren in het voorjaar niet op een weide te laten waar het afgelopen jaar ook lammeren hebben gelopen. Het is verstandig om lammeren na mestonderzoek en gericht advies te ontwormen. Realiseert u zich dat diarree en eventuele sterfte bij lammeren ook door andere verwekkers zoals virussen, bacteriën en andere parasieten veroorzaakt kan worden. Neem bij twijfel contact met ons op.

Om een goede uitslag te krijgen is het belangrijk de mest op goede wijze te verzamelen. De beste manier is als volgt: verzamel verse mest van vijf tot tien lammeren, deze mag niet langer dan 30 minuten op de grond hebben gelegen! Bewaar het monster in de koelkast en lever het binnen een dag bij ons op de praktijk in. Het mestonderzoek wordt bij ons op de praktijk gedaan, u krijgt vaak nog dezelfde dag een uitslag met een gericht advies voor uw dieren!

Kosten voor dit mestonderzoek: € 25,46 incl. BTW



Wolschurft

Wij zien de laatste tijd steeds vaker schapen met wolschurft: schapen met jeuk zouden wel eens last kunnen hebben van de mijt die wolschurft veroorzaakt. Behalve jeuk - de schapen staan zich geregeld te schuren aan een boom of een ander object - vertonen de schapen onrust en woluitval. Ook worden de dieren vaak heel mager. De jeuk ontstaat door een allergische reactie op uitwerpselen van de mijten. Wolschurft is te herkennen aan gelige korsten die zich op het hele lichaam kunnen voordoen. De aandoening is heel besmettelijk. Meestal zijn de veroorzakers nieuwe dieren die worden toegevoegd aan een koppel. Heeft u twijfel of uw schapen ook aan deze aandoening lijden, neem dan contact met ons op voor advies en behandeling.

Bescherming tegen 'Het Bloed' en Zomerlongontsteking

Zomerlongontsteking is een veel voorkomende aandoening vooral bij opgroeiende lammeren. De acute longontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie, en kan plotselinge sterfte veroorzaken zonder voorafgaande klinische verschijnselen. "Het bloed" is een aandoening die kan voorkomen bij schapen en lammeren van elke leeftijd, maar het wordt vooral gezien bij snel groeiende lammeren van 3-10 weken leeftijd. Meestal worden dieren getroffen door "het bloed" dood gevonden. Er bestaat een combinatievaccin tegen beide ziekten.

Het geadviseerde moment van enten is afhankelijk van de problemen die spelen in uw koppel. Ziet u longontsteking- en het bloed-problemen voornamelijk in de eerste levensweken van uw lammeren, dan is het verstandig om uw oaien te enten. Wanneer uw oaien 4-6 weken voor het aflammeren volgens het juiste schema zijn gevaccineerd dan zijn uw lammeren door het drinken van de biest de eerste levensweken beschermd. Zijn uw oaien niet voor aflammeren gevaccineerd, of niet volgens het juiste schema, dan kunnen uw lammeren vanaf een leeftijd van 3 weken alsnog worden gevaccineerd.

De eerste vaccinatie in het leven van een dier bestaat altijd uit een basisenting: tweemaal vaccineren met ongeveer 4 weken tussentijd.



Entdagen

Vanaf 2013 organiseren wij entdagen voor de verschillende vaccinaties. Hierdoor kunnen we de entstoffen effectief gebruiken, hoeven wij het teveel aan entstof niet weg te gooien en niet aan u door te berekenen.

Wilt u uw dieren enten buiten deze entdagen, dan zijn we genoodzaakt de gehele verpakking te factureren.

De *vaste* entdag voor vaccinaties van schapen en geiten is de eerste vrijdag van elke maand.

U kunt bellen naar de praktijk om uw dieren in te laten plannen.

Brucella-monitoring

Bij het schaap kan de Brucella bacterie abortus veroorzaken. Om de afwezigheid van *Brucella melitensis* te monitoren moeten er in Nederland jaarlijks 15.000 bloedmonsters van schapen en geiten worden verzameld en onderzocht. Hiertoe heeft de NSFO (voorheen was deze monitoring in handen van de GD) bedrijven geselecteerd en deze bedrijven via een brief benaderd. Het is de bedoeling dat de schapen- of geitenhouder zelf een afspraak maakt met de dierenarts om een aantal dieren (maximaal 13) te laten bloedtappen. De kosten hiervan worden volledig vergoed. Mocht u zo'n brief van de NSFO hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons. Als u nog andere werkzaamheden te doen heeft bij uw schapen of geiten kan dit natuurlijk gecombineerd worden. U betaalt dan alleen voor deze handelingen: de visite wordt door de overheid vergoed.